

## 醫師討論指南

向醫療服務提供者詢問的常見問題，以判定LOQTORZI<sup>®</sup>治療是否適合您。

在您開始鼻咽癌 (NPC) 治療時，醫療服務提供者會回答您的任何問題。您可以使用以下問題幫助引導討論。

我得的是哪一類鼻咽癌？

---

LOQTORZI是一種處方藥，用於治療鼻咽癌 (NPC) 成年病人。

- 在鼻咽癌擴散到身體其他部位（轉移性）或者在附近組織重新出現（復發性）（局部晚期）時，LOQTORZI可以和化療藥物順鉑和吉西他濱合用，作為您的第一線治療。
- 在以下情況下，可以單獨使用LOQTORZI治療鼻咽癌：
  - 鼻咽癌重新出現而且無法手術切除**或者**
  - 鼻咽癌已擴散（轉移性），**而且**
  - 您已接受包括鉑類的化學治療，但沒有效果或者不再有效果。

LOQTORZI最常見的副作用是什麼？

---

LOQTORZI治療是否適合我？

---

我該如何控制我的疾病症狀？

---

在接下來的幾個月可能會發生什麼？

---

在開始治療之前需要做特定測試嗎？

---

我可以在哪裡更多了解鼻咽癌？

---

請參閱接下來幾頁上的重要安全資訊。

## 重要安全資訊

### 關於LOQTORZI® (toripalimab-tpzi)，我應該了解的最重要資訊是什麼？

LOQTORZI是一種透過與免疫系統合作來治療鼻咽癌的藥物。LOQTORZI可能導致您的免疫系統攻擊身體任何部位的正常器官和組織，並影響這些器官和組織的工作方式。這些問題有時可變得嚴重或危及生命，甚至可能導致死亡。您可能同時發生多個此類問題。這些問題可能在治療期間的任何時候發生，甚至在治療結束之後發生。

如果您出現以下問題的任何新的或惡化的體徵或症狀，請立即致電或去見您的醫療服務提供者，包括：

- 肺部問題：咳嗽、呼吸短促或胸痛。
- 腸道問題：腹瀉（稀便）或大便比平時更為頻繁；大便為黑色、柏油樣、黏稠或帶血或黏液；胃部（腹部）劇烈疼痛或觸痛。
- 肝臟問題：皮膚或眼白發黃；嚴重噁心或嘔吐；胃部（腹部）右側疼痛；深色尿液（茶色）；或比平常更容易出血或瘀傷。
- 荷爾蒙腺體問題：持續頭痛或異常頭痛；眼睛對光敏感；眼睛問題；心跳加速；出汗增多；極度疲勞；體重增加或減輕；感覺比平常更餓或更渴；排尿比平常頻繁；脫髮；感覺冷；便秘；聲音變得低沉；頭暈或昏厥；情緒或行為變化，例如性慾下降、易怒或健忘。
- 腎臟問題：尿量減少；尿血；腳踝腫脹；沒有食慾。
- 皮膚問題：皮疹；瘙癢；皮膚起泡或脫皮；口腔、鼻子、喉嚨或生殖器部位出現疼痛性瘡腫或潰瘍；發燒或類流感症狀；淋巴結腫大。
- 其他器官和組織也可能發生問題。這些並非是LOQTORZI可發生的免疫系統問題的所有體徵和症狀。如果出現任何新的或惡化的體徵或症狀，請立即致電或去見醫療服務提供者，包括：胸痛、心律不整、呼吸短促、腳踝腫脹；意識混亂、嗜睡、記憶問題、情緒或行為變化、頸部僵硬、平衡問題、手臂或腿部刺痛或麻木；複視、視力模糊、對光敏感、眼睛疼痛、視力改變；持續或嚴重的肌肉疼痛或無力、肌肉痙攣；紅血球偏低、瘀傷。
- 輸液反應有時可能嚴重或危及生命。輸液反應的體徵或症狀可能包括：發冷或發抖；瘙癢或皮疹；潮紅；呼吸短促或喘鳴；頭暈；感覺要昏倒；發燒；背痛。
- 排斥移植器官。取決於您所接受的器官移植類型，您的醫療服務提供者應該告訴您要報告和監測哪些體徵和症狀。
- 併發症，包括使用捐贈者幹細胞（同種異體）的骨髓（幹細胞）移植者出現的移植物抗宿主病 (GVHD)。這些併發症可能很嚴重，並可導致死亡。如果您在接受LOQTORZI治療之前或之後接受移植，可能會發生這些併發症。您的醫療服務提供者會監測您是否發生這些併發症。

立即接受治療可能有助於防止這些問題變得更加嚴重。您的醫療服務提供者會在LOQTORZI (toripalimab-tpzi) 治療期間檢查您是否有這些問題。您的醫療服務提供者可能會用皮質類固醇或荷爾蒙替代藥物為您治療。如果您有嚴重副作用，您的醫療服務提供者也可能需要延遲或完全停止LOQTORZI治療。

在接受LOQTORZI®之前，告訴您的醫療服務提供者您的所有病症，包括您是否：

- 有免疫系統問題，例如克隆氏症、潰瘍性結腸炎或狼瘡
- 接受過器官移植或者接受過或計劃接受使用捐贈者幹細胞（同種異體）的骨髓（幹細胞）移植
- 在胸部接受過放射治療
- 患有影響神經系統的病症，例如重症肌無力或格林巴利症候群
- 懷孕或計劃懷孕。LOQTORZI可傷害您未出生的寶寶。如果您能夠受孕，您的醫療服務提供者應該在您開始LOQTORZI治療之前做孕檢。在治療期間以及最後一劑LOQTORZI之後至少4個月，使用有效避孕措施。如果您認為自己可能懷孕或在LOQTORZI治療期間懷孕，請立即告訴您的醫療服務提供者
- 正在哺乳或計劃哺乳。目前尚不知道LOQTORZI是否會進入乳汁。在LOQTORZI治療期間以及最後一劑LOQTORZI之後4個月，不要哺乳

告訴您的醫療服務提供者您使用的所有藥物，包括處方藥和非處方藥、維他命和草藥補充劑。

LOQTORZI最常見的副作用是什麼？

- LOQTORZI與順鉑和吉西他濱合用時最常見的副作用包括：噁心；嘔吐、食慾下降；便秘；甲狀腺激素濃度低；皮疹；發燒；腹瀉；腳和腳趾灼熱或有針刺感；咳嗽；肌肉疼痛和骨痛；上呼吸道感染；睡眠問題；頭暈；並感覺全身不適。
- LOQTORZI單獨使用時的最常見副作用包括：疲倦；甲狀腺激素濃度低；肌肉疼痛和骨痛。

LOQTORZI可能的副作用不止這些。諮詢您的醫療服務提供者，獲取對副作用的醫學建議。

我們鼓勵您向FDA報告處方藥的副作用。

前往[www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)或致電1-800-FDA-1088。

LOQTORZI®注射液：單次劑量小瓶裝240 mg/6 mL (40 mg/mL) 溶液

請閱讀LOQTORZI [用藥指南](#)和[處方資訊](#)。