



INFÓRMESE SOBRE LOQTORZI[®]

El primer y único tratamiento autorizado por la FDA para pacientes que tienen un cáncer nasofaríngeo (CNF) que se ha extendido o reaparecido.

INDICACIONES

LOQTORZI[®] (toripalimab-tpzi) es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos que tienen un tipo de cáncer llamado carcinoma nasofaríngeo (CNF).

- LOQTORZI se puede usar en combinación con cisplatino y gemcitabina (medicamentos de quimioterapia) como primer tratamiento en casos de CNF metastásico (es decir, que se ha extendido a otras partes del cuerpo) o recurrente (es decir, que ha reaparecido) localmente avanzado (es decir, en tejidos cercanos).
- LOQTORZI se puede usar por sí solo en los casos de CNF recurrente (que han reaparecido) que no se pueden eliminar con cirugía o que son metastásicos (que se han extendido) y la persona recibió una quimioterapia con platino que no funcionó o dejó de funcionar.

Se desconoce la eficacia y la seguridad de LOQTORZI en los niños.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

Introducción	3
¿Qué es LOQTORZI?	4
¿Cómo funciona LOQTORZI?	5
LOQTORZI + quimioterapia*	6
¿Cuáles fueron los resultados del estudio?	6
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?	10
¿Cuál es el calendario de tratamiento con LOQTORZI?	11
LOQTORZI solo	12
¿Cuáles fueron los resultados del estudio?.....	12
¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?.....	13
¿Cuál es el calendario de tratamiento con LOQTORZI?	13
¿Cómo debo prepararme?.....	14
¿Qué sucede durante el tratamiento y después?.....	16
¿Qué preguntas importantes debo hacer?.....	18
Se dispone de apoyo económico	20
¿Cuál es la información importante de seguridad de LOQTORZI?	22
Glosario	23

*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

La información que aparece en esta guía tiene fines meramente informativos y no debe sustituir los consejos médicos que le dé su proveedor de atención médica. En caso de dudas o inquietudes sobre efectos secundarios o sobre su atención, sírvase consultar a su equipo de atención médica.

INTRODUCCIÓN

El cáncer nasofaríngeo (CNF) es un tipo de cáncer que comienza en la parte superior de la garganta, detrás de la nariz. Su proveedor de atención médica determinará cuál es la estrategia de tratamiento más idónea en función de muchos factores, entre ellos si usted recibió quimioterapia en el pasado, si el cáncer ha reaparecido después de un tratamiento anterior y qué tanto se ha extendido el cáncer.

LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) es la primera y única inmunoterapia autorizada por la FDA para tratar el CNF recurrente localmente avanzado o metastásico.

Este folleto lo/a ayudará a informarse sobre LOQTORZI como opción de tratamiento y le facilitará el diálogo con su equipo de atención médica a lo largo del tratamiento del CNF.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOQTORZI

LOQTORZI puede causar problemas que a veces pueden volverse graves o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Los efectos secundarios graves podrían incluir problemas pulmonares; problemas intestinales; problemas hepáticos; problemas de glándulas hormonales; problemas renales; problemas de piel; problemas en otros órganos y tejidos; reacciones severas a la infusión; rechazo de un órgano trasplantado; y complicaciones de un trasplante de células madre de donante (trasplante alógeno), como por ejemplo la enfermedad del injerto contra el hospedador (EICH). Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

 **LOQTORZI**®
(toripalimab-tpzi)injection **3**

¿QUÉ ES LOQTORZI?

LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos que tienen un tipo de cáncer llamado cáncer nasofaríngeo (CNF). Su proveedor de atención médica le recetará LOQTORZI con quimioterapia* o solo, en función de su enfermedad y sus antecedentes de tratamiento.

▶ LOQTORZI + QUIMIOTERAPIA*

LOQTORZI se puede usar combinado con quimioterapia* como primer tratamiento en los casos de CNF:

- Metastásico (es decir, que se ha extendido a otras partes del cuerpo) o
- Recurrente (es decir, que ha reaparecido) localmente avanzado (es decir, en tejidos cercanos)

Se puede mantener LOQTORZI sin quimioterapia después de haber recibido hasta 6 ciclos de quimioterapia†

*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

†En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró LOQTORZI solo.

▶ LOQTORZI SOLO

LOQTORZI se puede usar por sí solo para tratar el CNF cuando:

- es recurrente (ha reaparecido) y no se puede eliminar con cirugía o
- es metastásico (se ha extendido) y
- la persona recibió una quimioterapia con platino que no funcionó o dejó de funcionar

Se desconoce la eficacia y la seguridad de LOQTORZI en los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI?

LOQTORZI es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar el cáncer nasofaríngeo actuando con el sistema inmunitario. LOQTORZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque a órganos y tejidos normales de cualquier parte del cuerpo y alterar su funcionamiento. Estos problemas a veces pueden volverse severos o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Podrían aparecer más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento e incluso después de finalizar el tratamiento.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

 **LOQTORZI**®
(toripalimab-tpzi)injection 4

¿CÓMO FUNCIONA LOQTORZI?


LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) es un tipo de medicamento llamado inmunoterapia. A diferencia de la quimioterapia y la radioterapia, la inmunoterapia actúa ayudando a potenciar la capacidad del sistema inmunitario para atacar al cáncer.

▶ LOQTORZI POTENCIA LA CAPACIDAD DEL SISTEMA INMUNITARIO PARA DETECTAR LAS CÉLULAS CANCEROSAS Y DESTRUIRLAS

El sistema inmunitario produce linfocitos T, que son un tipo de células inmunitarias que detectan y destruyen gérmenes y células que nos hacen enfermar (por ejemplo, incluidas las células cancerosas).

Las células cancerosas son capaces de esconderse de los linfocitos T del sistema inmunitario, lo que permite que el cáncer crezca y se extienda sin ser detectado.

Muerte de la célula cancerosa



LOQTORZI ayuda a impedir que las células cancerosas se escondan de los linfocitos T. Esto potencia la capacidad del sistema inmunitario para detectar las células cancerosas y destruirlas.

LOQTORZI es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar el cáncer nasofaríngeo actuando con el sistema inmunitario. LOQTORZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque a órganos y tejidos normales de cualquier parte del cuerpo y alterar su funcionamiento. Estos problemas a veces pueden volverse severos o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Podrían aparecer más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento e incluso después de finalizar el tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas de los siguientes problemas:

- **Problemas pulmonares:** tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho.
- **Problemas intestinales:** diarrea (heces sueltas) o evacuaciones intestinales más frecuentes de lo habitual; heces de color negro, alquitranadas, pegajosas o que tienen sangre o mucosidad; casos severos de dolor o sensibilidad al tacto en el abdomen (la zona del estómago).

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO?

Se estudiaron la eficacia y la seguridad del tratamiento con LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) más quimioterapia* en personas que tenían cáncer nasofaríngeo metastásico (es decir, que se había extendido a otras partes del cuerpo) o recurrente (es decir, que había reaparecido) localmente avanzado (es decir, en tejidos cercanos) y no habían recibido quimioterapia ni radioterapia en los 6 meses anteriores.

En este estudio de 289 personas:



A 146 personas se les administró LOQTORZI más quimioterapia[†]



A 143 personas se les administró solo la quimioterapia[‡]

Después de los primeros 6 ciclos, quienes habían recibido LOQTORZI más quimioterapia[†] siguieron recibiendo LOQTORZI **sin quimioterapia** durante plazos de hasta 24 meses

*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

[†]En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró LOQTORZI solo.

[‡]En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina con placebo cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró placebo solo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Problemas hepáticos:** coloración amarilla de la piel o de la parte blanca de los ojos; casos severos de náuseas o vómitos; dolor en el lado derecho del abdomen (el área del estómago); coloración oscura de la orina (como de té); o sangrado o moretones con más facilidad de lo normal.
- **Problemas de glándulas hormonales:** dolores de cabeza que no se quitan o que son inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos acelerados; sudoración aumentada; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; más hambre o sed que de costumbre; orinar con más frecuencia de la habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; cambio a un tono de voz más grave; mareo o desmayo; alteración del estado de ánimo o de la conducta (por ejemplo, menos apetito sexual, irritabilidad o tendencia a olvidar las cosas).

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO? (CONTINUACIÓN)

► MÁS TIEMPO SIN QUE SU ENFERMEDAD EMPEORE[†]

En este estudio se analizaron los datos en distintos momentos

Primeros resultados del estudio, 30 de mayo de 2020



Resultados finales del estudio, 8 de junio de 2021



Las personas que recibieron LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) más quimioterapia[‡] permanecieron sin empeoramiento del cáncer durante más de 1 año más.[†]

El tratamiento con LOQTORZI más quimioterapia[‡] redujo el riesgo de empeoramiento de la enfermedad en con respecto a la quimioterapia^{||} sola

48%



*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

[†]Según la mediana de la supervivencia sin progresión. La mediana de la supervivencia sin progresión es el momento en que 50% de los participantes presentaron progresión de la enfermedad.

[‡]En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró LOQTORZI solo.

[§]Demora de 11.7 meses en el empeoramiento del cáncer.

^{||}En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina con placebo cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró placebo solo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Problemas renales:** disminución de la cantidad de orina; presencia de sangre en la orina; hinchazón de los tobillos; pérdida del apetito.
- **Problemas de piel:** erupción; picazón; ampollas o descamación en la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal; inflamación de ganglios linfáticos.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO? (CONTINUACIÓN)

En este estudio, con LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) más quimioterapia†

► MÁS PROBABILIDADES DE VIVIR MÁS QUE CON LA QUIMIOTERAPIA SOLA

En el análisis final (mediana de seguimiento de 36 meses), 61% (89 de 143) de las personas que recibieron LOQTORZI más quimioterapia† seguían con vida, por 47% (67 de 143) de las personas que recibieron la quimioterapia‡ sola.

El tratamiento con LOQTORZI más quimioterapia† redujo el riesgo de muerte en

37%

con respecto a la quimioterapia‡ sola



Un menor riesgo de muerte significa más tiempo para estar juntos

*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

†En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró LOQTORZI solo.

‡En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina con placebo cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró placebo solo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **También pueden aparecer problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden presentarse con LOQTORZI. Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas, como por ejemplo:** dolor en el pecho, irregularidades del latido cardíaco, dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, alteraciones del estado de ánimo o del comportamiento, rigidez de la nuca, problemas de equilibrio, hormigueos o adormecimiento en los brazos o las piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor ocular, alteraciones de la vista; dolor o debilidad musculares persistentes o severos, calambres musculares; cifras bajas de glóbulos rojos, moretones.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

 **LOQTORZI**[®]
(toripalimab-tpzi)injection

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO? (continuación)

▶ SUS TUMORES PODRÍAN DISMINUIR DE TAMAÑO O DESAPARECER

Primeros resultados del estudio, 30 de mayo de 2020

77% DE LOS PARTICIPANTES RESPONDIERON AL TRATAMIENTO CON LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) MÁS QUIMIOTERAPIA†

En 58%

de los participantes se redujo el tamaño tumoral

En 19%

de los participantes desaparecieron los tumores

66% DE LOS PARTICIPANTES RESPONDIERON AL TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA‡ SOLA

En 55%

de los participantes se redujo el tamaño tumoral

En 11%

de los participantes desaparecieron los tumores

*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

†En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró LOQTORZI solo.

‡En el estudio clínico se administraron cisplatino y gemcitabina con placebo cada 3 semanas en los primeros 6 ciclos de tratamiento, y después se administró placebo solo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Reacciones a la infusión que a veces pueden ser severas o poner en peligro la vida.** Entre los signos y síntomas de las reacciones a la infusión figuran: escalofríos o sacudidas; picazón o erupción; rubefacción; dificultad para respirar o silbidos pulmonares; mareo; sensación de desmayo; fiebre; dolor de espalda.
- **Rechazo de un órgano trasplantado.** Su proveedor de atención médica deberá informarlo/a de los signos y síntomas que debe vigilar y reportar en función del tipo de trasplante de órganos que le hayan hecho.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES?

Los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) más quimioterapia* son:

- Náuseas
- Vómitos
- Apetito disminuido
- Estreñimiento
- Cifra baja de hormona tiroidea
- Erupción
- Fiebre
- Diarrea
- Quemazón u hormigueos en los pies y los dedos de los pies
- Tos
- Dolor muscular y óseo
- Infección de las vías respiratorias superiores
- Problemas para dormir
- Mareo
- Sensación general de malestar

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían aparecer durante el tratamiento con LOQTORZI. Su proveedor de atención médica le ayudará a detectar y atender sus efectos secundarios. Por lo tanto, no olvide comunicarle a su equipo de atención médica cualquier síntoma que aparezca o haya empeorado.

*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el hospedador (EICH), en personas receptoras de un trasplante de médula ósea con células madres de donante (trasplante alógeno).** Estas complicaciones pueden ser graves y provocar la muerte. Estas complicaciones pueden producirse si la persona recibió un trasplante antes del tratamiento con LOQTORZI o lo recibe después del tratamiento. Su proveedor de atención médica lo/a vigilará por si aparecen estas complicaciones.

Recibir tratamiento médico de inmediato puede ayudar a impedir que esos problemas se vuelvan más graves. Su proveedor de atención médica estará atento/a a la posible aparición de estos problemas durante el tratamiento con LOQTORZI. Su proveedor de atención médica podrá administrarle tratamiento con corticoesteroides o con medicamentos de reemplazo hormonal. Además, su proveedor de atención médica podrá retrasar o detener por completo el tratamiento con LOQTORZI si usted presenta efectos secundarios severos.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE TRATAMIENTO CON LOQTORZI?

LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) se usa en combinación con quimioterapia*, y después se mantiene **sin quimioterapia**, como primer tratamiento en casos de cáncer nasofaríngeo que se ha extendido a otras partes del cuerpo o ha reaparecido en tejidos cercanos.



LOQTORZI más quimioterapia* se puede administrar en infusión intravenosa cada **3 semanas** por un máximo de 6 ciclos, y después se mantiene LOQTORZI sin quimioterapia durante un máximo de 2 años

Su médico vigilará su estado para asegurarse de que el tratamiento esté funcionando y los efectos secundarios sean tratables. Su médico decidirá la cantidad de tratamientos que resultan adecuados en su caso y podrá retrasar el tratamiento o suspenderlo definitivamente si usted tiene efectos secundarios severos.

CALENDARIO DE TRATAMIENTO CON LOQTORZI EN EL ESTUDIO,



*La quimioterapia es cisplatino y gemcitabina.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de recibir LOQTORZI, informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus problemas médicos, incluido:

- Si tiene problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus.
- Si recibió un trasplante de órganos o recibió o prevé recibir un trasplante de médula ósea con células madre de donante (trasplante alógeno).
- Si recibió radioterapia en la zona del pecho.
- Si tiene un trastorno del sistema nervioso, como la miastenia grave o el síndrome de Guillain-Barré.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO?

La eficacia y la seguridad del tratamiento con LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) por sí solo se estudió en un ensayo clínico realizado con 172 personas que tenían un cáncer nasofaríngeo metastásico (es decir, que se había extendido), recurrente (es decir, que había reaparecido) o que no se podía eliminar con cirugía y que habían recibido una quimioterapia con platino y no les había funcionado o les había dejado de funcionar.

▶ SUS TUMORES PODRÍAN DISMINUIR DE TAMAÑO O DESAPARECER

EN 1 DE CADA 5 PARTICIPANTES tratados con LOQTORZI, los tumores disminuyeron de tamaño o desaparecieron por completo



En 19%

de los participantes, los tumores disminuyeron de tamaño

En aprox. 2%

de los participantes, los tumores desaparecieron

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de recibir LOQTORZI, informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus problemas médicos, incluido: (continuación)

- Si está embarazada o tiene previsto embarazarse. LOQTORZI puede perjudicar al feto. Si usted puede embarazarse, su proveedor de atención médica deberá hacerle una prueba de embarazo antes de que usted comience el tratamiento con LOQTORZI. Deberá usar una anticoncepción eficaz durante el tratamiento y durante al menos los 4 meses posteriores a la última administración de LOQTORZI. Durante el tratamiento con LOQTORZI, si cree que podría estar embarazada o se embaraza, informe de inmediato a su proveedor de atención médica.
- Si está amamantando o tiene previsto amamantar. Se desconoce si LOQTORZI pasa a la leche materna. Usted no deberá amamantar durante el tratamiento con LOQTORZI ni en los 4 meses posteriores a la última administración de LOQTORZI.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, ya sean de venta con receta o de venta sin receta, vitaminas o suplementos herbales.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES?

Los efectos secundarios más frecuentes son:

- Cansancio
- Cifra baja de hormona tiroidea
- Dolor muscular y óseo

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LOQTORZI® (toripalimab-tpzi). Si desea orientación médica acerca de los efectos secundarios, hable con su proveedor de atención médica.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE TRATAMIENTO CON LOQTORZI?



LOQTORZI (3 mg/kg) por sí solo se administra por infusión intravenosa cada **2 semanas**



Su médico vigilará su estado para asegurarse de que el tratamiento esté funcionando y los efectos secundarios sean tratables. Su médico decidirá la cantidad de tratamientos que resultan adecuados en su caso y podrá retrasar el tratamiento o suspenderlo definitivamente si usted tiene efectos secundarios severos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI?

- Los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI cuando se administra con cisplatino y gemcitabina son: náuseas; vómitos; apetito disminuido; estreñimiento; cifra baja de hormona tiroidea; erupción; fiebre; diarrea; sensación de quemazón u hormigueos en los pies y los dedos de los pies; tos; dolor muscular y óseo; infección de las vías respiratorias superiores; problemas para dormir; mareo; y sensación general de malestar.
- Los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI cuando se administra solo son: cansancio; cifra baja de hormona tiroidea; dolor muscular y óseo.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CÓMO DEBO PREPARARME?

► CONOZCA A SU EQUIPO DE ATENCIÓN

Su atención estará dirigida por el oncólogo, que es el responsable del plan de tratamiento, pero todos los miembros del equipo desempeñan papeles importantes.

En la lista que figura a continuación se indican algunas de las personas del equipo que podrían encargarse de su atención.



EQUIPO PRINCIPAL

- Oncólogo médico
- Médico de cabecera
- Especialista en enfermería clínica
- Radiooncólogo
- Coordinador de enfermería oncológica



EQUIPO ESPECIALISTA

- Otorrinolaringólogo (médico especialista en oídos, nariz y garganta)
- Dentista
- Radioterapeuta



EQUIPO DE CUIDADOS SINTOMÁTICOS

- Cuidador
- Logopeda (terapeuta del habla)
- Nutriólogo o dietista
- Trabajador social de oncología
- Psiquiatra o psicoterapeuta

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI®? (continuación)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LOQTORZI. Si desea orientación médica acerca de los efectos secundarios, hable con su proveedor de atención médica.

Lo/a animamos a comunicar a la FDA los efectos secundarios de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

► PREPARACIÓN PARA LA INFUSIÓN

LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) se administra por infusión intravenosa (en una vena). Una enfermera registrada le administrará el tratamiento en el consultorio del médico o en un centro de infusiones. Esta persona le podrá aclarar también las dudas que tenga.



La primera infusión durará al menos **60 minutos**



Si en la primera infusión no aparece ninguna reacción relacionada con la infusión, las siguientes infusiones podrán durar **30 minutos**

Algunas reacciones a la infusión pueden ser severas o poner en peligro la vida. Algunos signos y síntomas de reacción a la infusión que podrían aparecer son:

- Escalofríos o sacudidas
- Mareo
- Picazón o erupción
- Sensación de desmayo
- Rubefacción
- Fiebre
- Dificultad para respirar o silbidos pulmonares
- Dolor de espalda

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI?

LOQTORZI es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar el cáncer nasofaríngeo actuando con el sistema inmunitario. LOQTORZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque a órganos y tejidos normales de cualquier parte del cuerpo y alterar su funcionamiento. Estos problemas a veces pueden volverse severos o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Podrían aparecer más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento e incluso después de finalizar el tratamiento.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

 **LOQTORZI**[®]
(toripalimab-tpzi)injection 15

¿QUÉ SUCEDE DURANTE EL TRATAMIENTO Y DESPUÉS?

▶ CONTROL DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS

En la zona de la infusión podrían aparecer moratones o irritación. Si nota alguna reacción al tratamiento o tiene dolor, dígaselo de inmediato a su proveedor de atención médica o enfermera.




Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica si aparece o empeora algún síntoma o efecto secundario del tratamiento, como la dificultad para respirar, los silbidos pulmonares, una erupción o fiebre.

▶ LA VIDA CON EL CÁNCER NASOFARÍNGEO

Vivir con la enfermedad podría requerir ajustes a la vida cotidiana, pero hay cosas que puede hacer para ayudar.



En función de cómo se sienta, es posible que pueda seguir con sus actividades cotidianas, como ir a trabajar o hacer ejercicio.



Recuerde que es importante descansar mucho para poder afrontar cada día.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI®? (continuación)

Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas de los siguientes problemas:

- **Problemas pulmonares:** tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho.
- **Problemas intestinales:** diarrea (heces sueltas) o evacuaciones intestinales más frecuentes de lo habitual; heces de color negro, alquitranadas, pegajosas o que tienen sangre o mucosidad; casos severos de dolor o sensibilidad al tacto en el abdomen (la zona del estómago).
- **Problemas hepáticos:** coloración amarilla de la piel o de la parte blanca de los ojos; casos severos de náuseas o vómitos; dolor en el lado derecho del abdomen (el área del estómago); coloración oscura de la orina (como de té); o sangrado o moretones con más facilidad de lo normal.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

► IMPLICAR A SUS FAMILIARES, AMISTADES O SERES QUERIDOS

A veces resulta abrumador manejar el diagnóstico, pero contar con el apoyo de familiares, amistades o seres queridos puede ayudar de distintos modos:



En la preparación de comidas y la ayuda con la limpieza de la casa, con las tareas de jardinería y con el lavado de la ropa



En la programación de citas médicas y la clasificación de los documentos médicos



En la comunicación con el equipo de atención médica



En la coordinación de los traslados o el cuidado de niños durante las citas y las infusiones



En la búsqueda de recursos de apoyo y de ayuda económica

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Problemas de glándulas hormonales:** dolores de cabeza que no se quitan o que son inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos acelerados; sudoración aumentada; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; más hambre o sed que de costumbre; orinar con más frecuencia de la habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; cambio a un tono de voz más grave; mareo o desmayo; alteración del estado de ánimo o de la conducta (por ejemplo, menos apetito sexual, irritabilidad o tendencia a olvidar las cosas).
- **Problemas renales:** disminución de la cantidad de orina; presencia de sangre en la orina; hinchazón de los tobillos; pérdida del apetito.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿QUÉ PREGUNTAS IMPORTANTES DEBO HACER?

► PREGUNTAS QUE HACER A MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Preparar una lista de dudas que consultar en las citas puede facilitar la conversación con su proveedor de atención médica acerca del diagnóstico y el tratamiento del cáncer nasofaríngeo.

¿Hay algún problema médico que deba comentarle antes de comenzar el tratamiento con LOQTORZI® (toripalimab-tpzi)?

¿Cuánto durará cada infusión?

Aparte de mi oncólogo, ¿a qué proveedores de atención médica acudiré periódicamente?

¿Cómo sabré si LOQTORZI está siendo eficaz para mí?

► LA VIDA CON MI ENFERMEDAD

¿Cómo podría afectar LOQTORZI mi vida y mi trabajo?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Problemas de piel:** erupción; picazón; ampollas o descamación en la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal; inflamación de ganglios linfáticos.
- **También pueden aparecer problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden presentarse con LOQTORZI. Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas, como por ejemplo:** dolor en el pecho, irregularidades del latido cardíaco, dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, alteraciones del estado de ánimo o del comportamiento, rigidez de la nuca, problemas de equilibrio, hormigueos o adormecimiento en los brazos o las piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor ocular, alteraciones de la vista; dolor o debilidad musculares persistentes o severos, calambres musculares; cifras bajas de glóbulos rojos, moretones.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

► VIGILANCIA Y MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS

¿Cuáles son los riesgos y posibles efectos secundarios de LOQTORZI® (toripalimab-tpzi)?

¿Qué puedo hacer si tengo efectos secundarios?

¿Cuándo debo llamarle para informar de cambios en los síntomas o los efectos secundarios?

► RECURSOS DE APOYO

¿Dónde puedo encontrar información sobre apoyo con el pago de LOQTORZI?

¿Cómo puedo atender los gastos directos de bolsillo (*out of pocket*)?

¿Hay grupos de apoyo para personas como yo?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

- **Reacciones a la infusión que a veces pueden ser severas o poner en peligro la vida.** Entre los signos y síntomas de las reacciones a la infusión figuran: escalofríos o sacudidas; picazón o erupción; rubefacción; dificultad para respirar o silbidos pulmonares; mareo; sensación de desmayo; fiebre; dolor de espalda.
- **Rechazo de un órgano trasplantado.** Su proveedor de atención médica deberá informarlo/a de los signos y síntomas que debe vigilar y reportar en función del tipo de trasplante de órganos que le hayan hecho.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

SE DISPONE DE APOYO ECONÓMICO

LOQTORZI Solutions, que forma parte de la familia de servicios de apoyo Coherus Solutions, ofrece diversos programas de apoyo a los pacientes a quienes se receta LOQTORZI® (toripalimab-tpzi).

▶ PROGRAMA DE AHORRO DEL COPAGO

Para los pacientes elegibles que cuentan con un seguro comercial, el programa de Coherus para el ahorro del copago de LOQTORZI podría cubrir una parte de los gastos directos de bolsillo asociados con LOQTORZI.



Según el programa, se cuenta con ayuda para los gastos de copago hasta un límite de 30,000 dólares por año civil. Los pacientes elegibles podrían pagar hasta solo \$0 por cada dosis de LOQTORZI.

Sírvase ver los criterios de elegibilidad que figuran a continuación.

▶ CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PACIENTE

- Que se haya recetado LOQTORZI para una finalidad médicamente adecuada en los 180 días posteriores a la inscripción en el programa.
- Tener un seguro médico comercial (privado o no gubernamental) que cubra los costos de medicamento de LOQTORZI.
- Ser mayor de 18 años y residente en los Estados Unidos.
- No tener cobertura por ningún programa de financiamiento federal, estatal o gubernamental, como Medicare, Medicare Advantage, parte D de Medicare, Departamento de Veteranos, Departamento de Defensa o TRICARE.
- No pedir a ningún tercero —incluidos los pagadores, las fundaciones de beneficencia o las cuentas de gastos flexibles (*Flexible Spending Accounts*, FSA) o las cuentas de ahorro para gastos médicos (*healthcare savings accounts*, HSA)— el reembolso total ni parcial del beneficio recibido de Coherus a través de este programa.
- Son aplicables otras restricciones; consulte los términos y condiciones en LOQTORZISolutions.com.
- El programa no es válido para los pacientes que paguen en efectivo ni en lugares donde la legislación lo prohíba.
- El programa de ahorro del copago de LOQTORZI es susceptible de ser alterado o cancelado sin previo aviso. Este programa no es un seguro médico.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

▶ PROGRAMA DE AYUDA AL PACIENTE

Si usted no tiene seguro, su seguro es funcionalmente insuficiente* o es un paciente de Medicare que atraviesa apuros económicos, es posible que pueda recibir LOQTORZI® (toripalimab-tpzi) sin costo para usted.

Sírvase ver los criterios de elegibilidad para recibir ayuda económica que figuran a continuación.

▶ CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR AYUDA ECONÓMICA

- Cumplir alguno de los siguientes requisitos: a) no tener seguro médico; b) tener un seguro funcionalmente insuficiente*; o c) ser un paciente asegurado con el servicio tradicional de honorarios por servicio (*Fee-for-Service*, FFS) de Medicare que demuestra atravesar apuros económicos y no puede pagar sus obligaciones de cuota de pago, lo que debe constatarse mediante una declaración firmada emitida por su proveedor.
- Tener unos ingresos anuales del hogar ajustados no superiores al 500% del nivel federal de pobreza (*Federal Poverty Level*, FPL).
- Llenar y firmar un formulario de consentimiento y, cuando corresponda, aportar documentación sobre ingresos.
- Estar al cuidado de un proveedor con licencia para ejercer en los Estados Unidos y recibir LOQTORZI en un centro establecido ubicado en los Estados Unidos donde el médico prescriptor preste sus servicios profesionales en el ámbito ambulatorio.
- LOQTORZI Solutions podría evaluar la elegibilidad del paciente para recibir la ayuda con carácter retrospectivo. Si desea más información, sírvase llamar a LOQTORZI Solutions al 1-844-483-3692. Los pacientes de Medicare no son elegibles para recibir ayuda retrospectiva.
- Si el paciente es elegible, el programa de ayuda al paciente cubre únicamente los costos de LOQTORZI y no cubre ningún gasto administrativo ni de consulta médica. Hay restricciones aplicables y el programa es inválido en lugares donde la legislación lo prohíba. Coherus podrá alterar o cancelar este programa en cualquier momento y por cualquier motivo.
- Ser residente en los Estados Unidos.
- El diagnóstico es una indicación autorizada por la FDA para LOQTORZI.
- No tener ninguna otra opción de apoyo económico.
- El paciente tendrá que recibir el medicamento en un centro ambulatorio y por parte del médico o del consultorio del médico.

*"Seguro funcionalmente insuficiente" significa que el paciente no tiene seguro o que tiene un seguro que no cubre LOQTORZI.

Si desea más información sobre recursos económicos o de consultorios de LOQTORZI Solutions, llame al 1-844-483-3692.

Coherus está con usted

Si desea más información sobre LOQTORZI, visite
LOQTORZI.com

 **LOQTORZI**®
(toripalimab-tpzi)injection 21

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DE LOQTORZI®?

Se presenta a continuación la información importante de seguridad. Si tiene alguna duda o inquietud, hable con su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI?

LOQTORZI es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar el cáncer nasofaríngeo actuando con el sistema inmunitario. LOQTORZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque a órganos y tejidos normales de cualquier parte del cuerpo y alterar su funcionamiento. Estos problemas a veces pueden volverse severos o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Podrían aparecer más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento e incluso después de finalizar el tratamiento.

Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas de los siguientes problemas:

- **Problemas pulmonares:** tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho.
 - **Problemas intestinales:** diarrea (heces sueltas) o evacuaciones intestinales más frecuentes de lo habitual; heces de color negro, alquitranadas, pegajosas o que tienen sangre o mucosidad; casos severos de dolor o sensibilidad al tacto en el abdomen (la zona del estómago).
 - **Problemas hepáticos:** coloración amarilla de la piel o de la parte blanca de los ojos; casos severos de náuseas o vómitos; dolor en el lado derecho del abdomen (el área del estómago); coloración oscura de la orina (como de té); o sangrado o moretones con más facilidad de lo normal.
 - **Problemas de glándulas hormonales:** dolores de cabeza que no se quitan o que son inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos acelerados; sudoración aumentada; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; más hambre o sed que de costumbre; orinar con más frecuencia de la habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; cambio a un tono de voz más grave; mareo o desmayo; alteración del estado de ánimo o de la conducta (por ejemplo, menos
- apetito sexual, irritabilidad o tendencia a olvidar las cosas).
- **Problemas renales:** disminución de la cantidad de orina; presencia de sangre en la orina; hinchazón de los tobillos; pérdida del apetito.
 - **Problemas de piel:** erupción; picazón; ampollas o descamación en la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal; inflamación de ganglios linfáticos.
 - **También pueden aparecer problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden presentarse con LOQTORZI. Llame o acuda de inmediato a su proveedor de atención médica en caso de aparición o agravamiento de signos o síntomas, como por ejemplo:** dolor en el pecho, irregularidades del latido cardíaco, dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, alteraciones del estado de ánimo o del comportamiento, rigidez de la nuca, problemas de equilibrio, hormigueos o adormecimiento en los brazos o las piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor ocular, alteraciones de la vista; dolor o debilidad musculares persistentes o severos, calambres musculares; cifras bajas de glóbulos rojos, moretones.
 - **Reacciones a la infusión que a veces pueden ser severas o poner en peligro la vida.** Entre los signos y síntomas de las reacciones a la infusión figuran: escalofríos o sacudidas; picazón o erupción; rubefacción; dificultad para respirar o silbidos pulmonares; mareo; sensación de desmayo; fiebre; dolor de espalda.
 - **Rechazo de un órgano trasplantado.** Su proveedor de atención médica deberá informarlo/a de los signos y síntomas que debe vigilar y reportar en función del tipo de trasplante de órganos que le hayan hecho.
 - **Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el hospedador (EICH),**

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DE LOQTORZI®?

(continuación)

Se presenta a continuación la información importante de seguridad. Si tiene alguna duda o inquietud, hable con su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

en personas receptoras de un trasplante de médula ósea con células madres de donante (trasplante alógeno). Estas complicaciones pueden ser graves y provocar la muerte.

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LOQTORZI? (continuación)

Estas complicaciones pueden producirse si la persona recibió un trasplante antes del tratamiento con LOQTORZI o lo recibe después del tratamiento. Su proveedor de atención médica lo/a vigilará por si aparecen estas complicaciones.

Recibir tratamiento médico de inmediato puede ayudar a impedir que esos problemas se vuelvan más graves. Su proveedor de atención médica estará atento/a a la posible aparición de estos problemas durante el tratamiento con LOQTORZI. Su proveedor de atención médica podrá administrarle tratamiento con corticoesteroides o con medicamentos de reemplazo hormonal. Además, su proveedor de atención médica podrá retrasar o detener por completo el tratamiento con LOQTORZI si usted presenta efectos secundarios severos.

Antes de recibir LOQTORZI, informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus problemas médicos, incluido:

Antes de recibir LOQTORZI, informe a su proveedor de atención médica sobre todos sus problemas médicos, incluido:

- Si tiene problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus.
- Si recibió un trasplante de órganos o recibió o prevé recibir un trasplante de médula ósea con células madre de donante (trasplante alógeno).
- Si recibió radioterapia en la zona del pecho.
- Si tiene un trastorno del sistema nervioso, como la miastenia grave o el síndrome de Guillain-Barré.
- Si está embarazada o tiene previsto embarazarse. LOQTORZI puede perjudicar al feto. Si usted puede embarazarse, su proveedor de atención médica deberá hacerle una prueba de embarazo antes de que usted comience el tratamiento con LOQTORZI. Deberá usar una anticoncepción eficaz durante el tratamiento y durante al menos

los 4 meses posteriores a la última administración de LOQTORZI. Durante el tratamiento con LOQTORZI, si cree que podría estar embarazada o se embaraza, informe de inmediato a su proveedor de atención médica.

- Si está amamantando o tiene previsto amamantar. Se desconoce si LOQTORZI pasa a la leche materna. Usted no deberá amamantar durante el tratamiento con LOQTORZI ni en los 4 meses posteriores a la última administración de LOQTORZI.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, ya sean de venta con receta o de venta sin receta, vitaminas o suplementos herbales.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI?

- Los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI cuando se administra con cisplatino y gemcitabina son: náuseas; vómitos; apetito disminuido; estreñimiento; cifra baja de hormona tiroidea; erupción; fiebre; diarrea; sensación de quemazón u hormigueos en los pies y los dedos de los pies; tos; dolor muscular y óseo; infección de las vías respiratorias superiores; problemas para dormir; mareo; y sensación general de malestar.
- Los efectos secundarios más frecuentes de LOQTORZI cuando se administra solo son: cansancio; cifra baja de hormona tiroidea; dolor muscular y óseo.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LOQTORZI. Si desea orientación médica acerca de los efectos secundarios, hable con su proveedor de atención médica.

Lo/a animamos a comunicar a la FDA los efectos secundarios de los medicamentos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

LOQTORZI® inyectable: solución de 240 mg/6 mL (40 mg/mL) en frasco ampula unidosis.

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

GLOSARIO

Cáncer nasofaríngeo: Tipo de cáncer que comienza en la nasofaringe, que es la parte superior de la garganta, detrás de la nariz y cerca de la base del cráneo.

Inmunoterapia: Tipo de tratamiento que usa el sistema inmunitario de la propia persona para luchar contra el cáncer.

Linfocitos T: Células especializadas del sistema inmunitario que protegen de las infecciones y pueden ayudar a luchar contra el crecimiento del cáncer.

Localmente avanzado: Cáncer que se ha extendido desde el lugar en el que comenzó hasta tejidos cercanos.

Metastásico: Cáncer que se ha extendido desde el lugar en el que comenzó hasta otras partes del cuerpo.

Quimioterapia: Medicación que se usa para detener el crecimiento de las células cancerosas. Se puede usar sola o en combinación con otros tratamientos.

Radioterapia: Uso de radiación para matar las células cancerosas y hacer que los tumores disminuyan de tamaño.

Recurrente: Cáncer que ha reaparecido. El cáncer puede reaparecer en el mismo lugar del tumor original o en otro lugar del cuerpo.

Sistema inmunitario: Gran red de órganos, células y tejidos que ayuda al organismo a luchar contra las infecciones y otras enfermedades.

Supervivencia general: El tiempo, contado desde la fecha del diagnóstico o del comienzo del tratamiento, que permanecen con vida las personas que tienen una enfermedad (por ejemplo, cáncer). En un ensayo clínico, medir la supervivencia general es una forma de ver qué tan bien funciona un nuevo tratamiento.

Supervivencia sin progresión: El tiempo, durante el tratamiento y después de él, que un paciente vive teniendo una enfermedad (por ejemplo, el cáncer) pero sin que esta empeore.

Tasa de respuesta global: Porcentaje de participantes de un estudio o grupo de tratamiento que presentaron respuesta parcial o completa al tratamiento dentro de un plazo determinado. En un ensayo clínico, medir la tasa de respuesta global es una forma de ver qué tan bien funciona un nuevo tratamiento.



 **LOQTORZI**[®]
(toripalimab-tpzi)injection

Si desea recibir de LOQTORZI Solutions más información sobre apoyo al paciente para recibir LOQTORZI, llame al 1-844-483-3692.

Si desea más información sobre LOQTORZI, visite LOQTORZI.com

Sírvase leer la información importante de seguridad que figura en esta guía y haga clic en [Guía del medicamento](#) y en [Información para la prescripción](#) para leer estos documentos de LOQTORZI.

LOQTORZI es una marca comercial registrada y LOQTORZI Solutions y Coherus Solutions son marcas comerciales de Coherus BioSciences, Inc.

© 2024 Coherus BioSciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-LOQ-0094 05/24

